不同类型矿床的空间分布模式及对区域矿产勘查的启示

左仁广^{1,2}

(1 地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083; 2 中国地质大学, 湖北 武汉 430074)

在一个地区, 往往同时发育多种类型的矿床。研究不同类型的矿床的空间关系, 对于深入了解区域成矿地质背景或成矿地质事件具有重要意义。如果两种类型的矿床空间分布相关, 往往是由 2 种原因造成的:

(I) 矿床 A 是产生矿床 B 的原因; (II) 矿床 A 和矿床 B 是同一地质作用的产物, 受相同的地质背景或构造条件控制。

与地质点空间分布类型一样, 两类矿床的空间关系服从 3 种分布: (I) 丛聚性分布, (II) 随机性分布和 (III) 均匀分布。这三种空间关系可分为两大类: 第一类为空间相关, 包括空间关系 (I); 第二类为空间不相关, 包括空间关系 (II) 和 (III) (Zuo et al., 2009; 2010)。这 3 类空间关系可用“最邻近距离函数”(nearest-neighbour test, Diggle's G; Diggle, 2003) 来判断:

$$G(w) = n^{-1} \#(w_i \leq w, d_i > w) \quad (1)$$

其中, $G(w)$ 代表小于或等于距离 w 的矿床点的累积距离分布, $\#$ 代表矿床数, (w_i, d_i) 表示每个矿床点的距离它的最邻近的点与最近点的距离。Diggle's G 是不对称的, $G_{ij} \neq G_{ji}$, 即矿床 A 与矿床 B 的空间关系不同于矿床 B 与矿床 A 的空间关系。它具有如下性质:

(1) 如果 $G(w) > G_{\text{Pois}}(w)$, 表示两类矿床的最邻近距离小于泊松分布 (随机分布), 显示出丛聚性分布特征, 意即矿床 A 的空间分布与矿床 B 的空间分布密切相关。

(2) 如果 $G(w) < G_{\text{Pois}}(w)$, 表示矿床 A 与矿床 B 的空间分布不相关。

图 1 Cu (左) 和 Au (右) 空间分布的 $G(w)$

Poiss $G(w)$ 为泊松分布曲线; Low $G(w)$ 和 high $G(w)$ 分别为泊松分布曲线误差区间的下限和上限

本文以祁连山发育的优势矿种 Cu 和 Au 矿床为例, 研究了两者的空间分布关系。数据主要来源于甘肃省和青海省地质调查院的矿产地分布图, 通过修编而成, 由 147 个 Cu 矿和 92 个 Au 矿点组成。结果表明:

(1) Cu 和 Au 矿床的空间分布服从丛聚性分布 (如图 1), 因为 Cu 和 Au 的 $G(w)$ 散点图远离泊松分布。

(2) Cu 和 Au 矿床空间分布和 Au 和 Cu 矿床的空间分布都显示出相关性 (图 2), Cu 和 Au 的空间关系和 Au 和 Cu 的空间关系都远离了泊松分布, 他们具有丛聚性分布的特征, 两者空间相关, 而且 Cu 和 Au 的空间相关性与 Au 和 Cu 的空间相关性不同。

图 2 Cu 和 Au 的空间相关性 (左) Au 和 Cu 的空间关系 (右)

Poiss $G(w)$ 为泊松分布曲线; Low $G(w)$ 和 high $G(w)$ 分别为泊松分布曲线的误差区间的下限和上限

(3) 为了进一步查明造成 Cu 和 Au 的空间分布的相关性的原因, 进行了 Fry analysis 分析 (Hanna et al., 1979; Fry, 1979), 结果表明 Cu 和 Au 的空间分布的玫瑰花图主要呈 288° 和 144° (图 3), 与

图 3 Cu (A) 和 Au (B) 空间分布的玫瑰花图

区域发育的 NWW 断层和褶皱一致。进而, 利用证据权 (Bonham-Carter, 1994) 做了 Cu 和 Au 矿床与断层的空间相关性分析 (t -value) (图 4), 发现 NWW 断层对 Cu 和 Au 的影响距离相当, Cu 为 3 km, Au 为 4 km, 说明 Cu 和 Au 矿床的空间相关性可能受 NWW 断层和褶皱影响。

分析结果表明 NWW 断层和褶皱可能是控制 Cu 和 Au 矿床空间分布的主要因素, 这可为区域矿产勘查提供有用的信息。

图 4 Cu (左) 和 Au (右) 与 NWW 断层距离的 t -value